

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 11-6-70 071007

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE

(ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE)

Villa Blanche - 62, Rte Nationale - La Neuville, 51-REIMS - Tél. 47.22.87 47.13.82

ABONNEMENT ANNUEL : 25 F

C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W

Régisseur de Recettes de la Direction
Départementale de l'Agriculture
à Châlons-sur-Marne

SUPPLÉMENT N° 1 au BULLETIN n° 117 de JUIN 1970

10 juin 1970/ N° 16

V I G N E

AVERTISSEMENTS.-

Mildiou :

Dans tous les vignobles ayant subi le violent orage du 9 et plus spécialement dans ceux touchés par la grêle, il convient d'intervenir aussi rapidement que possible. Partout ailleurs la pousse importante de ces derniers jours justifie le renouvellement de la protection.

Rappelons que, si des orages locaux se produisent ils justifient toujours l'application d'un traitement sans même attendre un avis de notre part.

Vers de la grappe.-

Un traitement avec un produit curatif doit être appliqué dès maintenant dans tous les vignobles contaminés.

INFORMATIONS.-

Oïdium.-

Il est opportun d'ajouter un soufre mouillable à la bouillie antimildiou.

Pyrale.-

Dans la majorité des cas les vers ont atteint un stade rendant la lutte difficile. Une intervention ne peut se justifier que dans les expositions les plus tardives.

G R A N D E C U L T U R E

AVERTISSEMENT.-

Mildiou de la pomme de terre.-

Sur les variétés sensibles, il est conseillé de réaliser un premier traitement des cultures situées dans des conditions très favorables au mildiou (fond de vallées ou "cuvettes" - terrain momentanément inondé - présence de rideaux d'arbres - proximité de tas de déchets non détruits au 10 mai).

INFORMATIONS.-

Pégomye de la betterave.-

Les pontes des mouches de première génération sont en nette régression. Il n'y a plus à envisager d'intervention sauf pour des cultures très déficientes.

Charançon des siliques sur colza de printemps.-

Des concentrations sont observées, en particulier dans les secteurs où les colzas de printemps sont relativement rares par rapport aux colzas d'hiver.

Intervenir avant formation des premières siliques dès que l'on remarque en moyenne un insecte par hampe florale.

Noctuelles sur betteraves et maïs.-

Depuis une semaine des dommages sont constatés sur betteraves et maïs et s'intensifient. De nombreuses chenilles sont encore à un stade jeune ce qui fait craindre des attaques prolongées.

Il est rappelé que le meilleur moyen de lutte consiste en l'emploi d'appâts empoisonnés épanchés à 30-50 kgs/hectare (spécialités commerciales sous forme de bouchons ou appâts préparés à la ferme avec du son humidifié et un insecticide type aldrine-diéldrine à 2 %).

Des traitements de surface sont d'une efficacité plus aléatoire. Opérer de préférence par localisation avec parathion, diéldrine, aldrine. Tripler les doses habituelles.

A R B R E S F R U I T I E R S

AVERTISSEMENT -

Tavelure du pommier.-

Renouveler le traitement en cas de lessivage par suite des orages survenus dans certains secteurs.

INFORMATIONS.-

Oïdium.- (rappel) Temps très favorable au champignon. Couper les pousses oïdiées et incorporer aux bouillies un anti oïdium.

Attention aux risques de brûlures par températures élevées.

Acarieus.-

Nous signalons des pontes importantes sur les pruniers. Les oeufs sont près d'éclore dans tous les secteurs, il y a donc lieu de surveiller attentivement les vergers et d'intervenir soit à l'aide d'un acaricide spécifique, soit à l'aide d'un insecticide systémique dont l'action se fera également sentir sur d'éventuelles populations de pucerons.

Carpocapse des pommes.-

Premières sorties des papillons dès le 7 juin. Dans la vallée de la Marne et dans l'Aube, une première protection devra être assurée entre le 15 et le 20 juin. Dans les Ardennes, attendre un prochain avis.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles,

R. PARIS - A..GODIN
H. de NEIRLEIRE

L'Inspecteur de la Circonscription
Phytopsanitaire "CHAMPAGNE"

J. DELATTRE